

## 泌尿器がん

### ・腎細胞がん

レジメン名	抗がん剤（一般名）	商品名	用量	用法	1クール
Axitinib + pembrolizumab	ベムプロリズマブ	キイトルーダ	200mg/body	day1	21
	アキシチニブ	インライタ	10mg/day	day1-21	
Nivolumab（2週毎）	ニボルマブ	オブジーボ	240mg/body	day1	14
Nivolumab（4週毎）	ニボルマブ	オブジーボ	480mg/body	day1	28
Pembrolizumab（3週毎）	ベムプロリズマブ	キイトルーダ	200mg/body	day1	21
Pembrolizumab（6週毎）	ベムプロリズマブ	キイトルーダ	400mg/body	day1	42
Pembrolizumab+Lenvatinib（3週毎）	ベムプロリズマブ	キイトルーダ	200mg/body	day1	21
	レンバチニブ	レンビマ	20mg/day	day1-21	
Pembrolizumab+Lenvatinib（6週毎）	ベムプロリズマブ	キイトルーダ	400mg/body	day1	42
	レンバチニブ	レンビマ	20mg/day	day1-42	

### ・前立腺がん

レジメン名	抗がん剤（一般名）	商品名	用量	用法	1クール
DTX+PSL	ドセタキセル	ドセタキセル	70mg/m <sup>2</sup>	day1	21
	プレドニゾン	プレドニゾン	10mg/day	day1-21	
CBZ+PSL	カバジタキセル	ジェブタナ	25mg/m <sup>2</sup>	day1	21
	プレドニゾン	プレドニゾン	10mg/day	day1-21	
Darolutamide+DTX	ドセタキセル	ドセタキセル	75mg/m <sup>2</sup>	day1	21
	ダロルタミド	ニューベクオ	1200mg/day	day1-21	

### ・尿路上皮がん

レジメン名	抗がん剤（一般名）	商品名	用量	用法	1クール
Avelumab	アベルマブ	バベンチオ	10mg/kg	day1	14
Nivolumab（術後補助、2週毎）	ニボルマブ	オブジーボ	240mg/body	day1	14
Nivolumab（術後補助、4週毎）	ニボルマブ	オブジーボ	480mg/body	day1	28
GEM+CDDP	ゲムシタビン	ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	day1.8.15	28
	シスプラチン	シスプラチン	70mg/m <sup>2</sup>	day2	
Enfortumab vedotin	エンホルツマブベドチン	バドゼブ	1.25mg/kg	day1.8.15	28
Pembrolizumab（3週毎）	ベムプロリズマブ	キイトルーダ	200mg/body	day1	21
Pembrolizumab（6週毎）	ベムプロリズマブ	キイトルーダ	400mg/body	day1	42
NAC-GC	ゲムシタビン	ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	day1.8	21
	シスプラチン	シスプラチン	70mg/m <sup>2</sup>	day2	